

2021 DATE DEL SECONDO DEI DUE TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI

CONTRO S.TITANUS. CICALINA VETTORE DELLA **FLAVESCENZA DORATA**



			DATE PRIMO TRATTAMENTO			SECONDO TRATTAMENTO.		
			PRODOTTI UTILIZZABILI (gruppo)			PRODOTTI UTILIZZABILI		
			A.1	B	C	a1	b	C
zone	Siti	comune	acetamiprid (neonicotinoidi)			PIRETROIDI O SIMIL	(neonicotinoidi)	Flupyradifurone
						Etofenprox	acetamiprid	
FOCOLAI	PRECOCI	BARENGO BOGOGNO BORGOMANERO BRIONA CRESSA FARA NO.SE MARANO T.NO MEZZOMERICO SUNO SIZZANO				acrinatrina		
	TARDIVI	BOCA/MAGGIORA CAVAGLIO D'AG CAVALLIRIO GHEMME GRIGNASCO ROMAGNANO S.				tau-fluvalinate *deltametrina (SOLO IN CASO PRESENZA POPILLIA)		
NELLE ZONE DI INSEDIAMENTO (LANDIONA E CARPIGNA)			VIGE LO STESSO OBBLIGO DI EFFETTUARE DUE TRATTAMENTI SEGUENDO LE INDICAZIONI DATE/PRODOTTI DEI SITI PRECOCI					

CHIUNQUE NON RISPETTI GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI E' PUNTO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA 400,00 A 2.400,00 EURO

NOTE PRATICHE AGGIUNTIVE TRATTARE CON VOLUMI D'ACQUA ALTI(ALMENO 500 L/HA) . **ACIDIFICARE** PORTANDO IL pH verso 6.0(p.es con Aceto a 0,5 l/ha)
VERIFICARE SEMPRE
LIMITAZIONI USO IN ETICHETTA

I TRATTAMENTI SONO ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORI con le date indicate A SECONDA DEL COMUNE ANCHE SU UVA AMERICANA

E SU QUALSIASI Pianta di vite anche singola in orti, cortili, giardini, pergolati. Spesso sono quelle più colpite!! Diffondere l'info

SOLO ZONE/VIGNETI CON (ATTUALE) PRESENZA DI POPILLIA JAPONICA (IN NETTO CALO) : VEDERE La NOTE NEL BOLL 11
 PREFERIBILMENTE UTILIZZARE ACETAMIPRID (POSSIBILE MAX 2 VOLTE CONSECUTIVE). OPPURE *DELTAMETRINA. MA VEDERE La NOTE NEI BOLL 11. SE GIA' EFFETTUATI DUE TRATTAMENTI INSETTICIDI CON ATTIVITA' VERSO CICALINE NON è OBBLIGATORIO EFFETTUARNE ULTERIORI!!

PER LA SALVAGUARDIA DEGLI INSETTI PRONUBI (LEGGE REG. N.20 DEL 3/8/98)

SI RAMMENTA: DIVIETO TRATTAMENTI IN FIORITURA. **OBBLIGO SFALCIO** PRELIMINARE FIORITURE SPONTANEE NEL VIGNETO. EVITARE DERIVA DOPO IL TRATTAMENTO TRASCORSO IL TEMPO DI RIENTRO(ALMENO 48 H) ESTIRPARE LE PIANTE MALATE ED ELIMINARE I TRALCI CON I SINTOMI. QUESTO SERVE PER TOGLIERE LA FONTE DEL FITOPLASMA CHE RENDE INFETTIVO L'INSETTO VETTORE (SCAFOIDEO)