



Centro Servizi Intercomunale Colline Novaresi

Cavaglio d'Agogna Suno
Mezzomerico Barengo
Romagnano Sesia
Marano Ticino
Sizzano Boca
Maggiore
Bogogno Ghemme
Briona
Cressa
Fara

Avviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE

NR **5** 2021 ore 06.55 del **8** GIUGNO

SITUAZIONE

Estrema disomogeneità nella fenologica (da pre a fine fioritura dei nebbioli più precoci) che si compie con un ritardo di oltre una settimana rispetto alle ultime annate. Dopo ieri prosegue la settimana temporalesca MOLTO PERICOLOSA per quel che riguarda Peronospora. ESTREMA ATTENZIONE DUNQUE.

PERONOSPORA

INTERVENIRE Entro MERCOLEDÌ 9 GIUGNO (TRASCORSI 8-10 GG MAX DAL

PRECEDENTE, con criterio assoluto di anticipo su temporali) UTILIZZANDO FORM.TI COMM.LI CONTENENTI:

*FAMIGLIA/GRUPPO: MANCOZEB O FOLPET O METIRAM O DITHIANON (TUTTI P.A DI COPERTURA (NON PIÙ DI 4

TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/(ANNO) in associazione A *FAMIGLIA/GRUPPO: FENILAMMIDI (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO) : BENALAXYL (3MAX), BENALAXYL-M (3MAX), METALAXYL-M (3MAX), oppure A

AMETOCTRADINA (QoSi) (3 TRATT/MAX) OPPURE A FLUOPICOLIDE+COPERTURA(2 TRATT/MAX) OPPURE A OXATIPHIPIROLIN + ZOAMIDE (O FOLPET)(ZORVEC).

SE SONO PRESENTI PARECCHIE MACCHIE DI PERONOSPORA VALUTARE USO DI : DIMETOMORF (4MAX),

IPROVALICARB(4MAX), MANDIPROPAMIDE(4MAX), VALIFENALATE(4MAX), BENTHIAVALICARB(2MAX). TUTTI FANNO PARTE

*FAMIGLIA/GRUPPO: CAA (4 TRATTAMENTI COMPLESS./MAX/ANNO. DOPO 3 UTILIZZI -EVENTUALI CONSECUTIVI-, OBBLIGO DI ALTERNARE UNA SA DI GRUPPO DIVERSO)

OIDIO

Se non già utilizzati due volte nei precedenti trattamenti (in tal caso meglio alternare prima del 3^ eventuale utilizzo

ricorrere a prodotti contenenti : *FAMIGLIA/GRUPPO: IBE (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO) :

ATTENZIONE TRA ESSI: FLUTRIAFOL-MICLOBUTANIL-DIFEN/TEBU/CONAZOLO (TUTTI 1 trattamento/MASSIMO/ANNO).

mentre: FENBU/PEN/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 TRATTAMENTI/MAX/ANNO). Associare ad essi ZOLFO BAGNABILE (SE NON

GIÀ FORM.NE COMBI) IN CHIAVE ANTIRESTISTENZA.. OPPURE alternandoli con quelli della FAMIGLIA/GRUPPO: STROBILURINE

(3 TRATT. COMPLESS./MAX/ANNO) : AZOXY(2)TRIFLOXY(3)PYRACLO(3)-STROBIN (TRATT/MAX). questi ultimi hanno anche

funzione COLIATFRAI F ANTIROTTRITICA/RIACK ROT.

ATTENZIONE ALLA TUTELA DELLE API: La Legge Regionale n. 1/2019, articolo 96, comma 9, prevede:

"Al fine di tutelare..... sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api ... durante il periodo di fioritura, Trattamenti altresì VIETATI se sono presenti secrezioni nettariifere extraforiali su piante. con presenza di melata o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia attesa

che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api". **PERTANTO OCCORRE VERIFICARE ATTENTAMENTE**

EVENTUALI INDICAZIONI VINCOLANTI DI TOSSICITÀ IN MERITO RIPORTATE IN ETICHETTA

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO .DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESI

VIGASIO@VIGNAIOLI .IT

TUTTE LE INDICAZIONI SUI NOMI COMMERCIALI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE