



Centro Servizi Intercomunale Colline Novaresi
Cavaglio d'Agogna Suno
Mezzomerico Barengo
Romagnano Sesia
Marano Ticino
Sizzano Boca
Maggiora
Bogogno Ghemme
Briona
Cressa
Fara

Avviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE

NR **6** 2021 ore 17.00 del **11** luglio

SITUAZIONE

Nei primi dieci giorni di luglio le piogge sono state molto localizzate, con accumuli medi tra i 5 ed i 15 mm nelle zone più a Nord). Per tutta la prossima decade è attualmente prevista ancora assoluta assenza di precipitazioni accompagnata da temperature vicine ai 35 °C. Sono in aumento i primi danni legati alle 'ustioni' solari, finora comunque limitati. Ma attenzione!!!!... entriamo proprio ora nella fase assolutamente più critica per questo tipo di problematiche in concomitanza con le temperature critiche sopra prospettate.

OIDIO (Mal Bianco)

Nella norma,

si consiglia di ripristinare la protezione dei vigneti intervenendo

ENTRO MERCOLEDÌ 13 LUGLIO

con prodotti a base di **Zolfo Bagnabile a dosaggi solo medi** di etichetta (attenzione alle ustioni!) o BICARBONATO DI POTASSIO complementandoli, se compatibili, con prodotti biostimolanti (cerevisane, laminarina ecc) almeno per 3 volte consecutive, anche in funzione antiperonosporica, scegliendo tra quelli bivalenti oppure ricorrendo a Cos-Oga e/o Sostanze attive di biocontrollo.

Solo in caso di problematiche specifiche valutare altri antioidici specifici precedentemente consigliati e considerando tutte le limitazioni accompagnatorie

PERONOSPORA

Lievi riscontri in situazioni particolari di nuove macchie nelle poche situazioni di vigneti che stanno emettendo femminelle. Il decorso meteo prospettato, assieme alla fase fenologica avanzata, determinano una valutazione del rischio estremamente bassa. NELLA STRAGANDE MAGGIORANZA DEI VIGNETI è possibile il ricorso esclusivo a prodotti di copertura rameici preferibilmente a maggior persistenza (ossicloruro, solfato tribasico) anche associate ad eventuali Biostimolanti come da sopraindicato consiglio nella sezione Oidio.

Nelle altre rare situazioni opportuno aggiungere INDUTTORI SISTEMICI (8 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO):); FOSFONATO DI POTASSIO(5MAX) FOSFONATO DI DISODIO (6MAX), FOSETYL AL(SENZA LIMITI).

POPILLIA JAPONICA. PROSEGUIRE ATTENTO MONITORAGGIO DEI VIGNETI RE.INTERVENENDO, SE NECESSARIO, AL RAGGIUNGIMENTO DELLA SOGLIA INDICATA NEL BOLLETTINO PRECEDENTE 5BIS. ATTENZIONE, PER ORA PRIVILEGIARE IL RICORSO AL SECONDO TRATTAMENTO CON ACETAMIPRID, LASCIANDO L'UTILIZZO DI DELTAMETRINA (AUTORIZZATO IN DEROGA) COME ULTIMA POSSIBILITA' PER EVITARE CONSEGUENTI ATTACCHI DI RAGNETTO ROSSO.

SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI INSETTICIDI EFFETTUATI CONTRO POPILLIA JAPONICA, SONO CONSIDERATI A TUTTI GLI EFFETTI 'VALIDI' AI FINI DELL'OBLIGATORIETA' DEI DUE TRATTAMENTI PER FLAVESCEZZA, SE IL F.COMMERCIALE CONTIENE UNA SA EFFICACE ANCHE CONTRO LE 'CICALINE' (PER ESEMPIO: ACETAMIPRID, DELTAMETRINA, ETOFENPROX...). PERTANTO CHI AVESSE ESEGUITO GIÀ DUE INTERVENTI CON UNA DI TALI SA (di cui la seconda intorno al 15.7) NON È TENUTO, OBLIGATORIAMENTE, A REINTERVENIRE.

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO .DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESE

TUTTE LE INDICAZIONI SUI PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONE E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE