

2021 DATE DEL PRIMO DEI DUE TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI



CONTRO S.TITANUS. CICALINA VETTORE DELLA FLAVESCENZA DORATA

			DATE PRIMO TRATTAMENTO			SECONDO TRATTAMENTO.			OBLIGATORIO
			PRODOTTI UTILIZZABILI (gruppo)			PRODOTTI UTILIZZABILI			
			A	B	C	A	B	C	
zone	siti	comune	acetamiprid (neonicotinoidi)	Flupyradifurone		PIRETROIDI acrinatrina tau-fluvalinate	clorpirifos metile (fosfororganici)	etofenprox (Fenossibenzil eteri)	
FOCOLAI	PRECOCI	BARENGO BOGOGNO BORGOMANERO BRIONA CRESSA FARA NO.SE MARANO T.NO MEZZOMERICO SUNO SIZZANO	5-10 luglio	6-11 luglio					
	TARDIVI	BOCA CAVAGLIO D'AG CAVALLIRIO GHEMME GRIGNASCO ROMAGNANO S.	8-9 luglio	9-11 luglio					
NELLE ZONE DI INSEDIAMENTO (LANDIONA E CARPIGNA			VIGE LO STESSO OBBLIGO DI EFFETTUARE DUE TRATTAMENTI SEGUENDO LE INDICAZIONI DATE/PRODOTTI DEI SITI PRECOCI						

IN TUTTI GLI ALTRI COMUNI DEL NOVARESE (p.es MAGGIORA E OVE SIA PRESENTE VITE DA VINO/TAVOLA (ZONE INDENNI PARTICOLARMENTE A RISCHIO) O OVE VIGE COMUNQUE L'OBBLIGO DI UN SOLO (UNICO) TRATTAMENTO INSETTICIDA ESSO VA POSIZIONATO 10 GIORNI DOPO LA DATA CONSIGLIATA PER IL 1°TRATTAMENTO PER ESEMPIO: ACETAMIPRID INTORNO AL 20 LUGLIO

NOTE PRATICHE AGGIUNTIVE TRATTARE CON VOLUMI D'ACQUA ALTI(ALMENO 500 L/HA) . **ACIDIFICARE** PORTANDO IL pH verso 6.0(p.es con Aceto a 0,5 l/ha)
VERIFICARE SEMPRE NEI 2 TRATT.TI ALTERNARE PA INSETTICIDI DI GRUPPI DIVERSI(A/B/C).

LIMITAZIONI USO IN ETICHETTA

I TRATTAMENTI SONO ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORI con le date indicate A SECONDA DEL COMUNE ANCHE SU UVA AMERICANA

E SU QUALSIASI PIANTA DI VITE ANCHE SINGOLA IN ORTI, CORTILI, GIARDINI, PERGOLATI. SPESSO SONO QUELLE PIÙ COLPITE!! DIFFONDERE L'INFO

SU ISABELLA O ALTRI IBRIDI/ DIFESA BIOLOGICA POSSIBILE UTILIZZARE AZADIRACTINA CON PARZIALE EFFETTO ABBATTENTE/REPELLENTE SU POPILLIA

ZONE/VIGNETI CON PRESENZA DI POPILLIA JAPONICA: VEDERE TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL

BOLLETTINO SPECIFICO 7 BIS DEL 30.06. IN CASO DI PRESENZA DI POPILLIA POSSIBILE ANTICIPARE IL POSIZIONAMENTO DELL'INTERVENTO CON ACETAMIPRID

IL PRODOTTO PIÙ CONSIGLIATO SE NECESSARIO TRATTARE PER FORTE INFESTAZIONE È ACETAMIPRID

PROSEGUE IN SECONDA PAGINA: SALVAGUARDIA INSETTI PRONUBI E VIGNETI ADIACENTI AREE FREQUENTATE DA GRUPPI VULNERABILI

PER LA SALVAGUARDIA DEGLI INSETTI PRONUBI (LEGGE REG. N.20 DEL 3/8/98)

SI RAMMENTA: DIVIETO TRATTAMENTI IN FIORITURA. OBBLIGO SFALCIO PRELIMINARE FIORITURE SPONTANEE NEL VIGNETO. EVITARE DERIVA DOPO IL TRATTAMENTO TRASCORSO IL TEMPO DI RIENTRO(ALMENO 48 H) ESTIRPARE LE PIANTE MALATE ED ELIMINARE I TRALCI CON I SINTOMI. QUESTO SERVE PER TOGLIERE LA FONTE DEL FITOPLASMA CHE RENDE INFETTIVO L'INSETTO VETTORE (SCAFOIDEO)

VIGNETI ADIACENTI AD AREE FREQUENTATE DA GRUPPI VULNERABILI

(punto A.5.6 del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

Nei vigneti a distanze inferiori a 10 metri da aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili ed aree verdi di plessi scolastici, parchi gioco, strutture sanitarie), devono essere adottati i seguenti accorgimenti:

- distribuire la miscela verso l'interno del vigneto
- utilizzare coadiuvanti antideriva
- non utilizzare cannoni per la distribuzione della miscela insetticida
- segnalare preventivamente alla popolazione l'esecuzione dei trattamenti con adeguata cartellonistica
- trattare nelle ore di minor frequentazione.