2016 DATE DEL SECONDO TRATTAMENTO INSETTICIDA OBBLIGATORIO

CONTRO S.TITANUS. CICALINA VETTORE DELLA FLAVESCENZA DORATA

Cavaglio d'Agogna Suno Mezzomerico Barengo Romagnano Sesia Marano Ticino Sizzano Boca Bo gog no Ghemme Briona Cressa Fara

VIGNAIOLI PIEMONTESI

zone	siti	comune	DATE PRIMO TRATTAMENTO PRODOTTI UTILIZZABILI (gruppo) A	B	C		DATE SECONDDO TRATTAMENTO. PRODOTTI UTILIZZABILI A	B	C	
			thiametoxam	**clorpirifos etile*** **			thiametoxam	**clorpirifos metile**	**etofenprox**	
			acetamiprid	cloripirifos metile			**acetamiprid**	**clorpirifos etile*** **	(Fenossibenzil eteri)	
			(neonicotinoidi)				(neonicotinoidi)	(fosforganici)		
FOCOLAI	PRECOCI	BOGOGNO MARANO T.NO MEZZOMERICO SUNO	COMUNI ORIENTALI INTERESSATI DA DIFFUSIONE DI POPILLIA JAPONICA VEDASI BOLLETTINO SPECIFICO EMESSO IN PRECEDENZA			OBBLIGATORIO	**28 -30 luglio**	**29-31 luglio**	**30 lug- 1 ago**	OBBLIGATORIO
		BRIONA CRESSA FARA NO.SE BORGOMANERO BARENGO SIZZANO								
	TARDIVI	BOCA********** CAVAGLIO D'AG CAVALLIRIO GHEMME GRIGNASCO ROMAGNANO S.	SALVO ESITO MONITORAGGIO PROGETTO BOCAFDFREE				**30 lug- 1 ago**	**2-3 agosto**	**4-6 agosto**	

NELLE ZONE DI INSEDIAMENTO (LANDIONA E CARPIGNANO SESIA) VIGE LO STESSO OBBLIGO DI EFFETTUARE DUE TRATTAMENTI SEGUENDO LE INDICAZIONI DATE/PRODOTTI DEI SITI PRECOCI

NOTE PRATICHE AGGIUNTIVE
VERFICARE SEMPRE
LIMITAZIONI USO IN ETICHETTA

*** E' SCONSIGLIATO (E VIETATO PER LE AZIENDE IN PSR) L'UTILIZZO DI CLORIPIRIFOS ETILE OLTRE IL 30 LUGLIO

TRATTARE CON VOLUMI D'ACQUA ADEGUATI(ALMENO 500 L/HA) . **ACIDIFICARE** PORTANDO IL pH verso 6.0(p.es con Aceto a mezzo litro/hl

ALTERNARE PA INSETTICIDI DI GRUPPI DIVERSI(A/B/C). PRIVILEGIANDO-ALL'INTERNO DEL GRUPPO/MOMENTO QUELLO IN **GRASSETTO**

P.ESEMPIO MEGLIO UTILIZZARE CLORPIRIFOS ETILE NEL 1^ TRATTAMENTO, CLORPIRIFOS METILE NEL SECONDO***

VIETATO UTILIZZARE NEL PRIMO E NEL SECONDO TRATTAMENTO P.A ALL'INTERNO DEL GRUPPO A (NEONICOTINOIDI) EVENTUALMENTE SI DAL TERZO

I TRATTAMENTI SONO ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORI con le date indicate A SECONDA DEL COMUNE ANCHE SU UVA AMERICANA

E SU QUALSIASI PIANTA DI VITE ANCHE SINGOLA IN ORTI, CORTILI, GIARDINI, PERGOLATI. SPESSO SONO QUELLE Più COLPITE!! DIFFONDERE L'INFO

SONO PREVISTI CONTROLLI A TAPPETO SULL'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI INSETTICIDI DA PARTE DEI FUNZIONARI PROVINCIALI E REGIONALI. PREVISTE SANZIONI FINO A 1200 EURO ALL'ETTARO IN CASO D'INADEMPIENZA

PER LA SALVAGUARDIA DEGLI INSETTI PRONUBI (LEGGE REG. N.20 DEL 3/8/98)

SI RAMMENTA: DIVIETO TRATTAMENTI IN FIORITURA. OBBLIGO SFALCIO PRELIMINARE FIORITURE SPONTANEE NEL VIGNETO. EVITARE DERIVA DOPO IL TRATTAMENTO TRASCORSO IL TEMPO DI RIENTRO(ALMENO 48 H) ESTIRPARE LE PIANTE MALATE ED ELIMINARE I TRALCI CON I SINTOMI. QUESTO SERVE PER TOGLIERE LA FONTE DEL FITOPLASMA CHE RENDE INFETTIVO L'INSETTO VETTORE (SCAFOIDEO)

Devono essere **evitati i trattamenti in presenza di melata da metcalfa** nei mesi di luglio e agosto.

Nel caso di presenza di melata, per evitare apicidi, è utile intervenire in precedenza con un trattamento con sali potassici per il lavaggio della melata