



Centro Servizi Intercomunale Colline Novaresi

Bollettino Difesa Vite nr 8

16 giugno 2016

PERONOSPORA

La fioritura volge pressochè ovunque al termine (tranne boca/croatina), con tempi lunghi ed esito disomogeneo causa maltempo. Il pericolo potenziale del patogeno causa instabilità passata e prevista ancora per i prossimi giorni, resta **MOLTO** elevato.

Si consiglia di rinnovare il trattamento precedente DA DOMANI, VENERDI 17.6.16 o comunque non APPENA POSSIBILE TEMPESTIVAMENTE

Utilizzando preferibilmente uno dei seguenti PA (esistono anche formulazioni già pronte di queste miscele)

DIMETOMORF (forum 50 wp-feudo-quasar-slogan) O
MANDIPROPAMID (pergado sc) O IPROVALICARB (melody) O VALIFENALATE (valis) O BENTHIAVALICARB (vincare)
Tutti appartenenti alla famiglia dei CAA, penetranti. (massimo 3 trattamenti per molecola ma al massimo 4 nel complesso del gruppo. Dopo il 3° trattamento consecutivo con CAA impiegare s.a antiperonosporiche di diversa famiglia)

In miscela con RAME oppure FOLPET (meglio su vigneti lievemente grandinati) oppure ZOXAMIDE (**4 TRATTAMENTI MAX/ANNO**)

PER IL RAME CONTEGGIARE E LIMITARE L'APPORTO MASSIMO A 6 KG/RAME METALLO ALL'ETTARO.

I P.RAMEICI ne CONTENGONO IN MEDIA IL 20-25 % (ma è DA VERIFICARE in etichetta) PER CUI PER ESEMPIO CON 4 KG DI PRODOTTO X SI APPORTANO MEDIAMENTE 800-1000 g di rame metallo/ettaro e si possono fare 6-8 trattamenti/anno

(limitare al massimo a 4 trattamenti nel complesso tra per mancozeb, dithianon, folpet

I DITIOCARBAMMATI : MANCOZEB, METIRAM, PROPINEB non vanno più utilizzati oltre il 20 giugno

**OIDIO (MAL BIANCO) E SOPRATTUTTO ATTENZIONE AL BLACK ROT
PERMANGONO DIFFUSI RISCONTRI DI MACCHIE DI QUEST'ULTIMO O PATOGENO**

Absolutamente consigliati ancora prodotti ad azione collaterale ,
contenti nella Fam. IBE (FENBU/ PEN/ TETRA/ CIPRO/DIFENO/ PROPI/-TEBU-conazolo, MICLOBUTANIL
(MAX 3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/ANNO)

Anche MICLOBUTANIL+QUINOXYFEN (arius system) (CON QUINOXYFEN MAX 2 TRATTAMENTI/ANNO)

Si consiglia di aggiungere ai suddetti prodotti, se non lo contengono già, ZOLFO BAGNABILE dosi medio(alte (x es. 3-4 kg/ha).

Oppure TRIFLOXYSTROBIN (flint) oppure AZOXYSTROBIN (quadris) (appartengono al gruppo QOI assieme a FENAMIDONE, FAMOXADONE, PYRACLOSTROBIN : max 3 trattamenti/max anno nel complesso.

IDEALE ALTERNARLI nei prossimi 2-3 trattamenti : IBE- FLINT(QUADRI)- IBE-FLINT(QUADRI)

INTERVENTI IN VERDE

PROCEDERE AL PIÙ PRESTO CON LA CIMATURA- INOLTRE ALMENO SU NEBBIOLO ALLA SFOGLIATURA ZONA IN MODO CHE SI ADATTI DA SUBITO ALL'ESPOSIZIONE SOLARE. ATTENZIONE ANNATA A RISCHIO FORTISSIMO USTIONI.

TUTTE LE INDICAZIONI SUI NOMI COMMERCIALI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI

SONO SEMPRE DA VERIFICARE.

INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE)

FLAVESCENZA DORATA

Si consiglia di ATTENDERE!

**L'INSETTO RESPONSABILE è ANCORA
INDIETRO NEL SUO CICLO BIOLOGICO**

E' IN CORSO ACCURATO MONITORAGGIO

**NON è ANCORA IL MOMENTO PER EFFETTUARE IL
TRATTAMENTO!** inoltre eventi temporaleschi
previsti potrebbero vanificarne l'effetto

**NEL PROSSIMO BOLLETTINO, A BREVE,
VERRANNO INDICATI TUTTI I DETTAGLI
DELL'INTERVENTO,**

**ORIENTATIVAMENTE
SI POSIZIONERÀ ALMENO TRA UNA
SETTIMANA**

**GIA' DA ORA SI RAMMENTA
PER LA SALVAGUARDIA DEGLI INSETTI PRONUBI(UTILI)**
1) DIVIETO TRATTAMENTI IN FIORITURA.
2) OBBLIGO SFALCIO VEGETAZIONE SOTTOFILARE.
3) EVITARE FENOMENI DERIVA