



# Centro Servizi Intercomunale Colline Novaresi

## Bollettino Difesa Vite nr 10. 5 luglio

### PERONOSPORA

Permane un **rischio molto elevato**. In presenza di macchie fogliari sporulate (bianche sotto) si ricorda che anche le bagnature notturne possono diffondere nuove infezioni secondarie.

**Si consiglia di rinnovare il trattamento ENTRO GIOVEDÌ 14 luglio** in anticipo sul previsto un passaggio temporalesco da domenica, su inizio settimana prossima

Utilizzando PRODOTTI DI COPERTURA RAMEICI SOTTO FORMA PREFERIBILE DI IDROSSIDO)  
IN ASSOCIAZIONE A FOSETYL ALLUMINIO- O FOSFONATO DI POTASSIO (max 5 trattamenti all'anno)  
O CIMOXANIL (curzate-vitene et al) (max 3 trattamenti all'anno)

NEI CASI Più GRAVI, INVECE

in associazione a DIMETOMORF (forum 50 wp-feudo-quasar-slogan) O  
MANDIPROPAMID (pergado sc) O  
IPROVALICARB O

**Tutti appartenenti alla famiglia dei CAA, assieme a VALIFENALATE ,BENTHIAVALICARB .Sono penetranti i. (massimo 3 trattamenti per molecola ma al massimo 4 nel complesso del gruppo. Dopo il 3°trattamento consecutivo con CAA impiegare e s.a antiperonosporiche di diversa famiglia).**

IN ALTERNATIVA INDICATA ANCHE LA MISCELA RAME+METALAXIL-M (ridomil gold r, cumeta flow et al)

**(METALAXIL E BENALAXIL SONO FENILAMMIDI: CON PA DI QUESTA FAMIGLIA MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO. ATTENZIONE, METALAXIL-M è DIVERSO DAL SOLO METALAXIL COME BENALAXIL-M è DIVERSO DAL SOLO BENALAXIL . CON METALAXIL (pes MEVAXIL M) è POSSIBILE FARE SOLO 1 TRATTAMENTO ALL'ANNO**

**SI RICORDA: PER IL RAME LIMITARE L'APPORTO A 6 KG/RAME METALLO ALL'ETTARO.**

I P.RAMEICI ne CONTENGONO IN MEDIA IL 20-25 % (ma è DA VERIFICARE in etichetta) PER CUI CON 4 KG DI PRODOTTO X SI APPORTANO MEDIAMENTE 800-1000 g di rame  
OIDIO (MAL BIANCO)-BLACK ROT

ALTERNARE fungicidi a base di METRAFENONE (massimo 3 trattamenti/anno) oppure  
CYFLUFENAMMID ( 2 trattamenti/max/ anno) oppure BUPIMIRATE (nimrod) con fungicidi della Fam.  
IBE (FENBU/ PEN/ TETRA/ CIPRO/DIFENO/ PROPI/-TEBU-conazolo, MICLOBUTANIL  
(MAX 3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/ANNO

Si consiglia di aggiungere ai suddetti prodotti, se non lo contengono già, ZOLFO BAGNABILE a dosi medie ( x es. 1500-2000 g/ha).

**Si ricorda l'efficacia eradicante dei trattamenti con zolfo in polvere, rinforzante a breve distanza dal trattamento**

**ATTENZIONE INOLTRE ALLE USTIONI.COMPLETARE LE SFOGLIATURE SU NEBBIOLO ENTRO IL 10 LUGLIO. CONSIDERARE APPLICAZIONI A BASE DI CAOLINO E O PRODOTTI FILTRANTI GLI UV (RAYNOX PLUS)**

**TUTTE LE INDICAZIONI SUI NOMI COMMERCIALI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSIÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI**

**SONO SEMPRE DA VERIFICARE.**

**INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE è LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSIÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE)**